

# BATOTHECA EUROPÆA

PUBLIÉ PAR

**H. SUDRE**

Professeur à l'Ecole Normale de Toulouse (France)

3, rue André Délieux

---

FASCICULE XIV - 1916

---

Paraît par fascicules annuels de 50 numéros. Les collaborateurs qui fournissent 5 numéros convenus d'avance et préparés à 25 parts reçoivent un fascicule en échange; ils payent une cotisation annuelle de 2 fr. pour couvrir les frais d'impression des étiquettes et le port du fascicule qu'ils reçoivent. Chaque exemplaire doit comprendre, autant que possible, deux rameaux, l'un florifère et l'autre fructifère, plusieurs feuilles caulinaires et quelques pétales préparés à part. Les espèces déjà distribuées ne sont admises que si elles diffèrent quelque peu des formes publiées.

**Prix du fascicule : 25 fr.**

---

## COLLECTEURS POUR LE 14<sup>e</sup> FASCICULE

- C. Bicknell à Bordighera (Italie), n<sup>o</sup> 683.  
Dr Biau, à Castres (Tarn), n<sup>o</sup> 667.  
× Billot (Alsace), n<sup>o</sup> 689.  
J.-B. Charbonnel. La Chapelle-Laurent (Cantal), nos 675, 684, 687.  
× Chaboisseau (Vienne), n<sup>o</sup> 681.  
Charrier (Vendée), n<sup>o</sup> 676.  
× Coilliot, Le Mans (Sarthe), n<sup>o</sup> 688.  
Duffort, à Masseube (Gers), n<sup>o</sup> 680.  
A. Henry, Le Mans (Sarthe), n<sup>o</sup> 673.  
H. Hofmann, à Grossenhain (Saxe), nos 662, 665, 667.  
Holzfuss, à Stettin (Poméranie), nos 661, 663, 666, 670, 671, 692, 696.  
Dr Kinscher, Steinach (Thuringe), n<sup>o</sup> 668.  
× S. Kupcok (Hongrie), n<sup>o</sup> 652.  
× Levent (Marne), nos 682, 686.  
× P.-J. Müller (Alsace), nos 653, 672, 685, 690, 695, 697, 699.  
× Questier (Valois), nos 654, 669, 678, 693.  
Dr H. Sabransky (Styrie), n<sup>o</sup> 655.  
Spribille, Breslau, (Silésie), n<sup>o</sup> 691.  
H. Sudre, à Toulouse, nos 654, 656-660, 674, 679, 694, 698, 700.  
J.-B. Zinsmeister (Bavière), n<sup>o</sup> 664.

## OBSERVATIONS

Les collaborateurs sont priés de ne pas récolter les espèces déjà publiées dans le *Batotheca*. Ce fascicule renferme 26 *Rubus* non distribués dans des exsiccata numérotés.

H. SUDRE.

Sect. IV — **Appendiculati** Gen.

F — **GLANDULOSI** P.-J. Müll.

**651** — *R. ACICULARIS* L. et M. ; *R. rubig.* v. *trichacanthus* × *horrens* Sud. — France : Valois (Questier).

Paraît assez répandu du côté de Lévignen, mais toujours presque stérile.

**652** — *R. CUNICULICOLUS* Kpk. ; *R. rubiginosus* × *mutabilis* ? — Hongrie (Kupcok).

Les glandes pourpres montrent l'influence d'une forme du groupe *hirtus*, apparemment le *R. rubiginosus* ; l'autre parent est douteux.

**653** — *R. minutiflorus* Müll. ! — Alsace (Müller).

Spécimens authentiques !

**654** — *R. minutiflorus* Müll. var. *horridifactus* Sud. — France : Tarn (H. Sudre).

**655** — *R. HOPLOPHORUS* Sabrs. ; *R. minutiflorus* var. × *holochorus*. — Styrie (Sabransky).

Glandes et aculéation du *R. minutiflorus*, mais dentelure, pilosité et forme des feuilles rappelant le *R. holochlorus*. Peu fertile.

**656** — *R. trachyadenes* Sud. var. *glabrescens*. — France : Tarn (H. Sudre).

Dentelure moins grossière que d'habitude. Se rapproche un peu du *R. tenuidentatus* var. *jaclabundus*.

**657** — *R. declivis* Sud. — France : Tarn (H. Sudre).

Floraison très précoce ; station très basse. Très fertile.

**658** — *R. VIDUATUS* Sud. ; *R. declivis* × *lacertosus*. — France : Tarn (H. Sudre).

En société avec les parents et tout à fait stérile.

Sect. V — Triviales P.-J. Müll.

**659** — *R. CAESIUS* L. var. *mitissimus* (Rip.)  
— France : Tarn (H. Sudre).

**660** — *R. SERRULATUS* Lindg. ; *R. nitidus*  
 $\times$  *caesius*. — France : Tarn (H. Sudre).

Peu ou point fertile. Le *R. nitidus* n'est pas rare dans la région.

**661** — *R. SCABROSIFORMIS* Sud. ; *R. integribasis*  
 $\times$  *caesius*. — Allemagne : Poméranie (Holzfuss).

Forme très rapprochée du *R. integribasis* Müll.

**662** — *R. GOTHICUS* Fr. et Gel. ; *R. gratus*  
 $\times$  *caesius* Sud. — Saxe (Hofmann).

**663** — *R. SEMISPRENGELII* Sud. ; *R. Sprengelii*  
*caesius*. — Poméranie (Holzfuss).

Fleurs et principaux caractères du *R. Sprengelii* Vh., mais pétales et folioles larges. Fructifie partiellement.

**664** — *R. ZINSMEISTERI* Erdner ! ; *R. rhombifolius*  
 $\times$  *caesius* Sud. — Bavière (Zinsmeister).

Considéré par l'auteur comme un *R. caesius*  $\times$  *epipsyllus*, mais ne rappelle nullement ce dernier.

**665** — *R. WARNSTORFII* Focke ; *R. silesiacus*  
 $\times$  *caesius* Sud. — Saxe (H. Hofmann).

Le *R. silesiacus* Wh. se rencontre dans la même localité, d'après M. Hofmann.

**666** — *R. SEMIPYRAMIDALIS* Sud. ; *R. pyramidalis*  
 $\times$  *caesius*. — Poméranie (E. Holzfuss).

La pilosité de la face inférieure des feuilles ne peut provenir que du *R. pyramidalis* Kalt., qui est fréquent dans la région.

**667** — *R. BALFOURIANUS* Blox. — France : Vosges (Biau).

Hybride fixé dont l'origine reste douteuse.

**668** — *R. BALFOURIANUS* Blox. ; *R. ciliolentus* Kinscher ! — Silésie (Kinscher).

M. Kinscher a considéré cette plante comme un *R. caesius* × *Balfourianus*. Il ne me paraît pas qu'il y ait lieu de la séparer du n° 667.

**669** — *R. UMBELLIFORMIS* M. et L. ! ; *R. macrophyllus* × *caesius* Sud. — France : Valois (Questier).

Plus rapproché du *R. macrophyllus* que du *R. caesius*; très peu fertile.

**670** — *R. SEDINENSIS* Holzfuss ; *R. nemorensis* × *caesius* Sud. — Poméranie (Holzfuss).

Rappelle beaucoup le *R. nemorensis* L. et M., que M. Holzfuss m'a adressé des environs de Stettin.

**671** — *R. PRUINOSUS* Arrh. ; *R. caesius* × *villicaulis* Sud. — Poméranie (Holzfuss).

Forme aprique, un peu discolore, se rapprochant du *R. Wahlbergii* Arrh.

**672** — *R. CARNEISTYLUS* Müll. ! ; *R. caesius* × *incarnatus* Sud. — Alsace (Müller).

Très rapproché des n°s 667, 668, mais inflorescence non glanduleuse, turion presque grabre. Pourrait je crois dériver du *R. incarnatus*, qui croît dans les mêmes lieux.

**673** — *R. OPLOTHYRSOIDES* Sud. ; *R. oplothyrsus* × *caesius*. — France : Sarthe (Henry).

Croît dans le voisinage du *R. oplothyrsus* et fructifie partiellement.

**674** — *R. HEMILASIOTHYRSUS* Sud. ; *R. lasiothyrsus* × *caesius*. — France : Hte-Garonne (H. Sudre).

Rappelle un peu les hybrides de *caesius* et de *tomentosus*, toutefois turion pubescent, dentelure plus fine. Le *R. lasiothyrsus* est CC. dans cette région des Pyrénées.

**675** — *R. SEMIALBIFLORUS* Sud. ; *R. albiflorus* × *caesius*. — France : Cantal (Charbonnel).

**676** — *R. IMBRICATIFORMIS* Sud. ; *R. imbricatus* × *cæsius*. — France : Vendée (Charrier).

Forme aprique et peu normale, dérivant du *R. imbricatus* var. *virescens*.

**677** — *R. IMBRICATIFORMIS* Sud. var. *semisaxonicus* Sud. ; *R. imbricatus* var. *saxonicus* Hfm. × *cæsius* — Saxe (Hofmann).

Très rapproché de la var. *saxonicus* (*R. saxonicus* Hfn). Le *R. Wahlbergii* dérive du *R. villicaulis* Koebl.

**678** — *R. VALESIENSIS* Sud. ; *R. cardiophyllus* × *cæsius*. — France : Valois (Questier).

**679** — *R. MARTRINII* Sud. — France : Tarn (H. Sudre).

Probablement hybride fixé de *R. cæsius* et de *R. ulmifolius*.

Fertile et très répandu.

**680** — *R. AMPLIFOLIATUS* Sud. ; *R. ulmifolius* × *cæsius*. — France : Gers (Duffort).

Stérile.

**681** — *R. AMPLIFOLIATUS* Sud. var. *thamnocharis* (Müll. !)

Spécimens authentiques réunis par Chaboisseau pour les exsiccata de Müller.

**682** — *R. AMPLIFOLIATUS* Sud. var. *acanthophorus* (Müll.) — France : Marne (Levent).

**683** — *R. ASSURGENS* B. et Bv. f. *Provostii* Gen. ; *R. cæsius* × *ulmifolius*. — Italie (C. Bicknell).

**684** — *R. ASSURGENS* B. et Bv. var. *polyadenes* Sud. — France : Hte-Loire (Charbonnel).

Provient de quelque forme très aculéolée de *R. ulmifolius*.

**685** — *R. AMBIGUUS* Müll. ! *R. Godronii* × *cæsius*. — Alsace (Müller).

Quelques échantillons étaient sans étiquette, mais tous proviennent apparemment de la même localité.

**686** — *R. DISCOIDEUS* Müll. ! ; *R. Winteri* × *cæsius* Sud. — France : Marne (Levent).

**687** — *R. DURICORIUS* Gen. p. p. ; *R. cæsius* × *Winteri* Sud. — France : Cantal (Charbonnel).

Ronce grêle, rappelant le *R. Winteri* par la forme des folioles et la dentelure des feuilles.

**688** — *R. MACROPETALUS* M. et L. ; *R. propinquus* × *cæsius* Sud. — France : Sarthe (Coilliot).

**689** — *R. MOUGEOTII* Billot ! ; *R. cæsius* × *bifrons* Sud. — Alsace (Billot).

Echantillons sans feuilles caulinaires, que je distribue à cause de leur authenticité !

**690** — *R. MOUGEOTII* Billot ; *R. cæsius* × *bifrons* Sud. — Alsace (Müller).

Echantillons authentiques de *R. roseiflorus* Müll., provenant de plusieurs localités et dépourvus de feuilles caulinaires.

Müller avait reconnu lui-même que sa plante était identique à celle de Billot (n° 689).

**691** — *R. MOUGEOTII* Billot ; *R. cæsius* × *bifrons*. — Silésie (Spribille).

Le *R. Aschersonii* Sprib., bien que rappelant un peu les hybrides de *R. candicans*, doit dériver du *R. bifrons*, dont l'intervention rend compte de la coloration rose des fleurs et de la dentelure fine des feuilles.

**692** — *R. MOUGEOTII* Billot. ; *R. cæsius* × *bifrons*. — Poméranie (Holzfuss).

Forme moyenne, que j'ai reçue du collecteur sous le nom de *R. ambifarius*.

**693** — *R. HEMISTENOPETALUS* Sud. ; *R. stenopetalus* × *cæsius*. — France : Valois (Questier).

**694** — *R. EXOTERICUS* Sud. ; *R. lacertosus* × *cæsius*. — France : Tarn (H. Sudre).

Avec le *R. lacertosus*. Stérile.

**695** — *R. VIRGULTORUM* P.-J. Müll. ; *R. candicans* × *cæsius*. — Alsace (Müller).

C'est là la forme appelée *R. fasciculatus* par Müller (p. p.) et rappelant le *R. candicans* var. *coarctatus*. Quelques parts sont dépourvues de feuilles caulinaires. — Müller avait récolté cette plante dans son jardin, à Wissembourg.

**696** — *R. AMBIFARIUS* Müll. ; *R. thyrsanthus* × *cæsius*. — Saxe (H. Hofmann).

**697** — *R. LEUCOPHÆUS* P.-J. Müll. ! *R. cæsius* × *tomentosus* Sud. — Alsace (Müller).

**698**. — *R. LEUCOPHÆUS* P.-J. Müll. ! ; *R. cæsius* × *tomentosus* Sud. — France : Hte Garonne (H. Sudre).

Feuilles de l'extrémité des turions tomentelleuses en dessus.

**699** — *R. DELTOIDEUS* P.-J. Müll. ; *R. tomentosus* Lloydianus × *cæsius*. — Alsace (Müller).

**700** — *R. PSEUDODEGENER* Sud. ; *R. cæsius* × *tomentosus* Lloydianus. — France : Tarn (H. Sudre).

H. SUDRE.

Toulouse, juillet 1916.